

Radiopistage Canche



Lettre d'info n°4

LA REPRODUCTION APPROCHE

Dans les cours d'eau du Pas-de-Calais, la reproduction des Grands Salmonidés intervient globalement pendant les mois de décembre et de janvier, lorsque la température de l'eau descend sous les 10°C. Les géniteurs colonisent alors des zones typiques sur lesquelles ils pourront se reproduire. Ces frayères se situent majoritairement dans la partie amont des cours d'eau et correspondent à des secteurs où l'eau est courante (20 à 50 cm/s), peu profonde (30 à 80 cm de profondeur) et où le fond est constitué principalement de graviers et de galets (10 à 30 mm de diamètre).



Zone de reproduction sur la Course




Zone de reproduction sur la Ternoise

LES FRAYERES SUR LE BASSIN DE LA CANCHE

Les frayères potentielles de Grands Salmonidés sur le bassin de la Canche sont très majoritairement situées sur les affluents (Course, Créquoise et Ternoise) et sur la partie amont de la Canche.

Certaines d'entre elles sont aujourd'hui accessibles sans difficultés majeures pour les géniteurs, alors que certains linéaires restent difficilement accessibles ou totalement inaccessibles. Les données biologiques récoltées avec l'étude de radiopistage (franchissabilité des obstacles, retard à la migration, efficacité des dispositifs de franchissement) doivent permettre d'affiner le diagnostic sur les différents ouvrages.



Si vous souhaitez recevoir des informations régulières sur cette étude et sur les migrateurs dans les cours d'eau du Pas-de-Calais, n'hésitez pas à transmettre votre adresse mail à yann.le-peru@peche62.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir d'infos régulières sur cette étude, merci de le faire savoir par retour individuel de mail à la même adresse.